

目次

はじめに	iii
1 疫学	1
2 リスクファクター	2
1 加齢	2
2 喫煙	2
3 高血圧	3
4 糖尿病	3
5 脂質異常症	4
6 肥満および運動	5
7 うつ病	6
8 下部尿路症状 / 前立腺肥大症 [lower urinary tract symptoms (LUTS) / benign prostatic hyperplasia (BPH)]	6
9 薬剤	6
3 心血管疾患のマーカーあるいは初発症状としての ED	9
4 心血管系のリスクがある患者の管理	10
5 診断	12
1 基本評価	12
1) 診察室の環境など	12
2) 問診	12
3) 合併症	12
4) 薬物・嗜好品	12
5) 運動	12
6) 勃起機能問診票	13
7) 身体所見	13
8) 臨床検査	13
● ED 診断のフローチャート	15
2 オプション検査・特殊検査 (専門医による)	15

6 治療	16
1 目的	16
2 リスクファクターと合併症への対応	16
3 治癒可能な ED の発見と治療	16
1) テストステロンの低下	16
2) 若年者の外傷後の動脈性 ED	17
3) 心因性 ED	17
4 薬物療法	18
PDE5 (phosphodiesterase 5) 阻害剤	18
a. シルденаフィル (バイアグラ®)	18
b. バルデナフィル (レビトラ®)	19
c. タダラフィル (シアリス®)	19
d. 3 剤の比較	20
e. 効果判定	20
f. 副作用/併用禁忌	21
5 局所療法	22
1) 海綿体注射	22
2) 陰圧式勃起補助具	23
6 外科治療	23
1) 血管手術	23
2) プロステーシス挿入術	23
● ED 治療のフローチャート	24
文献	25
索引	32